

中药词典：蜀葵花 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_655342.htm 蜀葵花为锦葵科植物蜀葵的花朵，可治疗痢疾，吐血，血崩，带下，二便不通，疟疾，小儿风疹。蜀葵花【出处】《千金。食治》【拼音名】Sh Kuí Hu 【别名】侧金盏（《尔雅翼》），棋盘花（《分类草药性》），蜀其花（《本草推陈》），水芙蓉（《湖南药物志》），栽秧花（《贵州草药》），镢钹花、擗杖花（《陕西中草药》）。【来源】为锦葵科植物蜀葵的花朵。夏、秋采收，晒干。【原形态】蜀葵（《千金。食治》），又名：戎葵（《尔雅》），吴葵（《别录》），胡葵（《千金方》），一丈红（《草木记》）。二年生草本，高达2.5米。茎直立，具星状簇毛。叶互生，圆形至圆卵形，长6~10厘米，宽5~10厘米，先端圆钝，基部心形，通常具3~7浅裂，边缘具不整齐的钝齿，两面均有星状毛；叶柄长约4~8厘米，具星状簇毛。花单生于叶腋，有柄长约2.5厘米，小苞片7~8，基部连合，较萼为短；花萼圆杯状，5裂，裂片三角形，密被星状绒毛；花冠直径约7厘米，紫红色、淡红色或白色，花瓣5，倒卵形，先端边缘具不规则的齿裂，雄蕊多数，花丝结合成一圆柱体，花药密集其上；子房多室，心皮轮状排列，花柱上部分裂。果实扁球形，直径约3厘米。种子斜肾脏形，背部边缘竖起如鸡冠状，侧面有斜纹。花期5~10月。本植物的根（蜀葵根）、茎叶（蜀葵苗）、种子（蜀葵子）亦供药用，各详专条。【生境分布】各地均有栽培。【化学成份】花瓣含一种黄色素，熔点261（分解），可

能是有二苯酰甲醇型的结构与山柰酚相关的物质。其白花者，曾分离两种可能是二氢山柰酚的甙，一种是无色结晶，分解点235；另一种是淡黄色结晶，分解点261；前一种的甙元分解点是232，糖是葡萄糖。深黄色者曾分离一种葡萄糖甙，名蜀葵甙；它水解则生葡萄糖及蜀葵甙元。花的红色素，在酸性时呈红色，碱性时呈褐色，可作中和的指示剂。

【性味】甘，寒。《别录》：味咸，无毒。《千金。食治》：味甘，微寒滑，无毒。【功能主治】和血润燥，通利二便。治痢疾，吐血，血崩，带下，二便不通，疟疾，小儿风疹。《别录》：主理心气不足。《千金。食治》：定心气。《本草拾遗》：治小儿风疹。花有五色，白者疗痢疾，去邪气，阴干末食之。《尔雅翼》：敷疮肿。《珍珠囊》：治带下。赤治赤（带），白治白（带）。《纲目》：治带下，目中溜火，和血润燥，通窍，利大、小肠。

《分类草药性》：治红崩，吐血。红、白、淡三种，白治带症。《重庆草药》：和血，润肠，除邪热。治倒经，热毒燥结。【用法用量】内服：煎汤，1~2钱；或研末。外用：研末调敷。【注意】《四川中药志》：孕妇忌用。【附方】

治妇人白带下，脐腹冷痛，面色痿黄，日渐虚损：白蜀葵花五两。阴干，捣细罗为散，每于食前，以温酒调下二钱。如赤带下，亦用赤花。（《圣惠方》）治二便关格，脓闷欲死：蜀葵花一两（捣烂），麝香半钱。水一大盘，煎服，根亦可用。（《纲目》）治疟及邪热：蜀葵花白者。阴干，为末服之。（《本草图经》）治鼻面酒及酩酊：蜀葵花一合，研细，腊月脂调敷，每夜用之。（《仁存堂经验方》）治蝎螫：蜀葵花，石榴花、艾心等分。并取阴干，合捣

，和水涂之螫处。（《补缺肘后方》） 治烫伤：棋盘花三朵，泡麻油二两，搽患处。（《贵州草药》） 小编推荐：
#0000ff>中药词典：露蕊乌头 #0000ff>中药词典：石龙芮子
#0000ff>中药词典：矿物类代赭石 #000000>特别推荐：
#0000ff>2011年中医执业医师考试大纲#000000> #0000ff>考试时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com