

2011年临床执业医师内科辅导：突眼的临床表现 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_655401.htm

甲亢的突眼主要临床表现为眼球突出、畏光、流泪等。甲亢的突眼主要临床表现为眼球突出、畏光、流泪等。一、突眼可分为浸润性和非浸润性两种：1、非浸润性突眼是良性突眼，一般症状比较轻微；2、浸润性突眼为恶性突眼，眼度一般在18毫米以上；由于眼球高度突出，眼睑不能闭合，球结膜和角膜常暴露在外，故易受外界刺激而出现结膜充血、水肿、角膜炎和角膜溃疡，严重者可致全眼球炎而失明。上海瑞金医院核医学科管梁二、甲亢突眼的病因目前，关于其发病机制等研究尚未取得突破性进展，甚至有部分学者认为甲亢与突眼是自身免疫系统疾病中两个互为独立的疾病。部分甲亢患者会伴有眼球突出等情况，称之为甲亢突眼。有些甲亢患者没有突眼，有些甲亢患者以突眼为主要表现，临床上甲亢的严重程度与突眼的严重程度不相一致的，因此治疗上甲亢与突眼也是需要分别治疗的。小编推荐：[#0000ff>2011年内科辅导：克雷白杆菌肺炎](#)[#0000ff>2011年内科辅导：间质性肺疾病的诊断](#)[#0000ff>2011年内科辅导：不典型冠心病的症状](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业医师考前冲刺专题](#) 更多信息访问 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com