

2011年临床助理：宫颈肥大的物理疗法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_655403.htm

宫颈肥大的物理疗法：电熨术、冷冻疗法、激光治疗。1) 电熨术：用电熨头接触糜烂面，使组织凝固，形成痂皮，约二周后痂皮开始脱落，创面愈合一般需6~8周。手术应在月经净后3~5天进行。有附件炎者忌用。治疗后白带可暂增多或出血。如出血较多，可用消毒纱布压迫止血，24小时后取出。缺点是有时因疤痕收缩致宫颈狭窄。2) 冷冻疗法：用液氮快速降温装置，将探头置于糜烂面1~3分钟，自然复温后取出，使病变组织冷冻坏死。治疗后2~3周可流出很多水样分泌物。优点是出血及宫颈狭窄较少发生。3) 激光治疗：激光使糜烂组织炭化结痂，愈合过程同前两种治疗方法。物理疗法术后，多有大量黄水样白带自阴道流出，时间长短不一，应保持外阴清洁，一般需6~8周痊愈。在创面未完全愈合前，应避免盆浴、性交和阴道冲洗。术后可每周复查一次，观察愈合情况。注意有无宫颈狭窄，如有，可用探针轻轻扩张。 小编推荐：

#0000ff>2011年临床助理：母婴血型不合 #0000ff>2011年临床助理医师：急性附件炎汇总 #0000ff>2011年临床专业妇产科怀孕警惕葡萄胎 特别推荐： #ff0000>2011年临床助理医师考试大纲 #0000ff>考试时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com