

2011年公卫医师：预防夏季甲型肝炎的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_655434.htm

甲肝主要是通过消化道传染，与甲肝患者密切接触，共用餐具、茶具、牙具等，吃了肝炎病毒污染的食品和水，都可以受到传染。如果水源被甲肝病人的大便和其他排泄物污染，往往可以引起甲肝爆发流行。

- 1、搞好饮水卫生。加强饮水消毒，不论是自来水，还是井水、河水、塘水都要消毒。如50公斤水加漂粉精片1片，就可以杀灭甲肝病毒：如已有甲肝流行可适当加入漂粉精用量。为防止水源和农作物受到污染，不要用新鲜粪便，不要在河、塘内洗甲肝病人的衣物等。
- 2、不要吃不干净的食物，不喝生水。生吃瓜果要洗净。毛蚶、蛤蜊等水产品可能黏附甲肝病毒，不要生吃或半生吃。直接入口的食物如酱菜、凉拌的菜，不要在可能受污染的水中洗涤。
- 3、讲究食具茶具的卫生。
- 4、有肝炎流行时，勿办酒席。因甲肝病人在症状出现之前大便中就有病毒排出，在甲肝流行时因办酒席，宾客中可能有尚未发作的病人，容易引起产参宴者甲肝爆发。
- 5、早发现、早隔离、早治疗。甲肝病人症状明显出现以前，传染性很强，所以愈早发现、早隔离，就愈能减少传染的危险。在甲肝流行期，托幼机构要加强对儿童的检查，以便早期发现病人，早期隔离。甲肝病人的住室、活动的房间和衣物要消毒。
- 6、及时接种丙种球蛋白。儿童体内抵抗甲肝的抗体水平很低，所以，与甲肝病人有过接触日起两周内，及时接种丙种球蛋白，能保护不发病。
- 7、可用中草药预防。

相关推荐：#0000ff>2011年公卫传染病：腮腺炎的并发症

#0000ff>2011年公卫考点：小儿腮腺炎的症状 #0000ff>2011年
公卫考点：恙虫病的诊断及治疗 100Test 下载频道开通，各类
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com