

中药词典：铜钱菌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_655529.htm

铜钱菌为红菇科真菌劣味乳菇的子实体，主治腰腿酸痛；四肢麻木。铜钱菌【拼音名】Tón Qián Jūn【别名】环纹苦乳菇、蘑菇、环纹乳菇【来源】药材基源：为红菇科真菌劣味乳菇的子实体。

拉丁植物动物矿物名：Lactarius imulsus (Fr.) Fr.采收和储藏：夏、秋季采摘，晒干备用。【原形态】菌盖宽4-16cm.平展而中凹，近漏斗形；浅黄色、赭黄色，粘，稀有环纹。菌肉白色，乳汁白色，伤后不变色，具微辣及令人不适的异味。

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》

褶片直生至微下延。白色，成熟后变赭褐。孢子近球形，淡黄色，有疣突，(6-8.5) μm × (5.5-7) μm.菌柄浅白色或浅肉色，长1.5-5cm，直径0.6-1.8cm，因粘盖皮发达，故粘滑，可与相近的种区分。【生境分布】生态环境：生于混交林下。7-10月可见。资源分布：分布于河北、江苏、安徽、四川、云南等地。【性状】性状鉴别 菌盖扁球形，中央脐状，或呈漏斗形，直径3-12cm，深土黄色或污橘黄色，具深橙黄色同心环纹。菌肉浅白色。菌褶密，褶间有横脉，白色或黄褐色。菌柄长3.5-6.5cm，直径约1.6cm，类白色或浅肉色，松软或中空。气微，味异、微辣。【性味】苦；性温；有毒【功能主治】追风散寒；舒筋活络。主治腰腿酸痛；四肢麻木。【用法用量】内服：煎汤，3-9g.【摘录】《中华本草》