

中药词典：甜果藤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_655565.htm

甜果藤为茶茱萸科植物定心藤的根及藤茎，有活血调经、祛风除湿的功效。甜果藤【拼音名】Tián Gu Tén【别名】黄马胎、假丁公藤、铜钻、藤蛇总管、风药、冻骨风、黄九牛、电铜钻、黄藤、走马胎、羊不吃。【来源】药材基源：为茶茱萸科植物定心藤的根及藤茎。拉丁植物动物矿物名：Mappianthus iodoides Hand.Mazz.采收和储藏：冬季采收，挖取根部或割下藤茎，切片，晒干。【原形态】定心藤木质藤本。幼枝褐黄色，具棱，被黄褐色糙伏毛，老枝灰色，渐无毛，具灰白色皮孔；卷须粗壮，与叶轮生。叶对生或近对生；叶柄长6-14mm，圆柱形，上面具窄槽，疏被或密被黄褐毛糙伏毛；叶长椭圆形至长圆形，长8-17cm，宽3-7cm，先端渐尖至尾尖，有长1-1.5cm钝尖头，基部圆形或楔形，全缘，干时上面榄绿色，近无毛，下面赭黄色至紫红色，略被毛；中脉表面凹下，背面突起，侧脉3-6对，弧曲上升，在背面与细网脉均突起。雌雄异株，雄花序交替腋生，长1-2.5cm，花序梗长约1cm，被糙伏毛；花冠黄色，微香，长4-6mm，5裂片，裂片卵形，先端内弯，外面密被黄色糙伏毛，里面被短绒毛；雄蕊5，花丝干时橙黄色，长约3-4mm，花药黄色；雌蕊不发育，子房圆锥形，长约2mm，花柱长2-3mm.雌花序交替腋生，长1-1.5m，粗壮，被黄褐色糙伏毛，花序梗长5-8mm，雌花花梗长2-10mm；花萼浅杯状，长1-1.5mm，裂片5；花瓣5，长圆形，长3-4mm，先端内弯，外面密被黄褐色糙伏毛，

里面被短绒毛；退化雄蕊5，花丝扁线形，花药卵状三角形；子房近球形，长约2mm，密被黄褐毛硬伏毛，柱头盘状，5圆裂。核果椭圆形，长2-3.7cm，宽1-1.7cm，疏被淡黄色硬伏毛，熟时橙黄色，果肉薄，甜，干时具下陷网纹及纵槽。种子1颗。花期4-8月，雌花较晚，果期6-12月。【生境分布】生态环境：生于海拔800-1800m的疏林、灌丛及沟谷林内。资源分布：分布于福建、湖南、广东、海南、广西、贵州、云南等地。【栽培】生物学特性喜阴凉湿润的环境，耐阴、耐湿、耐寒。在高海拔或丘陵地带均能正常生长发育。以土层疏松、腐殖质丰富的壤土栽培为宜。栽培技术用种子繁殖。夏末至秋季果实陆续成熟，选择第一、二批饱满的果实，去掉果皮，洗去果肉，把种子稍晾干后可立即播种。选择有适当荫蔽条件的地方作苗床，开沟点播，沟距35cm，种子粒距3-4cm，覆土2cm，浇水保湿。当苗高25-30cm时，按行株距60cm×60cm开穴，每穴栽1株。【性味】苦；凉【功能主治】活血调经；祛风除湿。主治月经不调；痛经；闭经；产后腹痛；跌打损伤；外伤出血；风湿痹痛；腰膝酸痛。【用法用量】内服：煎汤，9-15g；或浸酒；或研粉，每次0.9-1.5g。外用：适量，研末，撒患处。【摘录】《中华本草》 小编推荐：#0000ff>中药词典：省沽油根 #0000ff>中药词典：扇叶阴地蕨 #0000ff>中药词典：疏叶香根芹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com