

2011年临床执业医师传染病学：新生儿脓疱病的症状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_655656.htm

新生儿脓疱病的症状：发热，精神萎靡、腹泻呕吐，绿色泡沫状粪便。为新生儿较严重的大疱病、又称新生儿天疱疮。【病因】由凝固酶阳性金黄色葡萄球菌第 噬菌体组外型菌株引起，系接触传染，多由婴儿室医护人员或患儿家属接触新生儿而传染。由于新生儿皮肤细嫩易破损，免疫功能发育不完善，或用塑料尿布使皮肤浸渍，都能促使该病发生，发病急，传染性强，易造成婴儿室流行，应引起重视。【症状】多在生后4~10天的新生儿发病，在暴露部位出现红斑，水疱或大疱，2-3天后成脓疱，疱壁薄，易破，成红色糜烂面，可蔓延至全身，水疱干涸形成薄痂或脱屑，如侵及口腔粘膜，影响吸奶，病情轻时，可无全身症状，严重时伴发热，精神萎靡、腹泻呕吐，绿色泡沫状粪便，易并发肾炎、肺炎、败血症、脑膜炎等死亡。【诊断】根据年龄，发病过程、临床特点易于诊断。小编推荐：[#0000ff>2011年传染病考点：组织胞浆菌病](#) [#0000ff>2011年传染病学高频考点：大头瘟](#) [#0000ff>2011年传染病学：黄热病的监测与处理](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业医师考试考后真题及答案交流](#) 更多信息访问 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com