

2011年口腔助理：良性口腔溃疡和恶性口腔溃疡的区分 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/655/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_655908.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_655908.htm)

口腔溃疡良、恶性的自我初步检查，可以考虑几个方面：1、溃疡发生的原因：要仔细考虑，并明确有无被食物烫伤、鱼刺扎伤、进食时咬伤等口腔创伤史；有无口腔黏膜病病史，如复发性口腔溃疡、白斑、扁平苔藓等；口腔内是否出现肿块、局部压迫、肿胀、疼痛、麻木、功能受限等改变。一般情况下，良性溃疡常伴有剧烈的疼痛，恶性溃疡则疼痛不很明显。2、溃疡的形态特征：面对光线充足处，找到溃疡部位，借助镜子，仔细观察。如果发现溃疡表浅，呈圆形或椭圆形，颜色鲜红，表面光滑，边缘不高出正常黏膜，且为多个溃疡，则良性的可能性大；如果溃疡的底部为较深的凹陷，形态不规则，呈暗红色，表面高低不平，边缘隆起，且为单个深大的溃疡，则要警惕恶性的可能。3、溃疡的质地：洗净双手，用手指轻轻地触摸溃疡及其周围部位，比较溃疡与周围组织的硬度差别，尤其是溃疡底部是否有硬结，溃疡的硬度越高，恶性的可能性就越大。4、溃疡附近的淋巴结：轻轻闭口，四指并拢，右侧面部用左手，左侧面部用右手，轻轻地触摸附近淋巴结。先摸耳郭前后方，然后到下颌角，最后沿着颈侧一直摸到锁骨，仔细辨别是否有肿大的淋巴结。正常情况下的淋巴结是摸不到的，在炎症或肿瘤时，可以摸到如黄豆大乃至蚕豆大的肿大的淋巴结。良性溃疡引起的淋巴结肿大，其表面光滑，并随着手指的活动而活动，如果肿大淋巴结，表面高低不平，与周围组织粘连，固定或活动受限，往往提示为恶性。

根据以上的自检结果，若出现异常怀疑为恶性，则必须尽快去医院做进一步的检查，单凭肉眼观察和手摸不能最终确定是否为恶性，只有通过病理切片检查才能最终明确诊断。相关推荐：[#0000ff>2011年口腔助理医师辅导：氟牙汇总](#)  
[#0000ff>2011年口腔助理医师考试：龋病的治疗汇总](#)  
[#0000ff>2011年口腔助理医师：蒙脱石散与口腔溃疡 100Test](#)  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)