

2012年口腔外科：口腔上颌窦瘘管修补术 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_655933.htm [适应证] 1.上颌窦根治术后切口长期不愈合，瘘管形成。或拔牙后伤口不愈合，形成瘘管。2.先天性瘘管。3.原因不明的口腔-上颌窦瘘管。 [手术器械] 上颌窦根治术器械，筛窦刮匙。 [术前准备] 1.术前设法找出形成瘘管的原因如上颌窦术后是否有异物留存，下鼻道“对孔”是否封闭或狭小。2.对先天性及不明原因瘘管作碘油造影以了解全面情况。3.抗生素控制感染。 [麻醉] 强化局麻。局部用药：1%普鲁卡因或2%利多卡因。强化麻醉用药：哌替啶及异丙嗪。 [手术方法] 1.经瘘口深入扩大，失禁量上颌窦，清除异物、息肉、坏死组织及不健康粘膜等。2.建立或改进下鼻道的“对孔”引流。3.以温生理盐水作瘘管冲洗。4.用刮匙、小尖刀、眼科剪等将瘘周围组织除去一圈，造成新鲜创面。5.取近瘘管的颊粘膜成带蒂瓣，此瓣长与阔均要比瘘管大2倍以上。6.窦内填塞碘仿纱条自鼻内引出。7.粘膜瓣缝合。 [注意事项] 瘘管及不健康组织务必清除彻底，以利愈合。 [术后处理] 1.应用抗生素2周。2.避免擤鼻，打喷嚏时张口，避免鼻内、窦内压力增加。3.术后48h抽出鼻内纱条，抽前多滴石蜡油。4.术后流质饮食至拆线后改半流质。5.术后10d拆线。 小编推荐：#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com