

2012年口腔外科：半岁左右宜做舌系带矫正术 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_655935.htm 孩子舌系带过短的现象并不少见，近来医院为不少舌系带过短的孩子进行了矫正手术。据介绍，100test舌系带过短会影响将来说话，尤其是一些卷舌音发音不准，因此，医生建议，如果孩子舌系带过短，最好在半岁左右进行矫正手术，以免影响孩子说话发音。舌系带过短影响发音 舌系带指舌根部的一条细细的粘膜，连接舌与口腔底部，当张口舌尖向上卷曲时即可看到。正常舌系带可使舌头活动自如，舌尖可自然地伸出口外，或向上舔到上腭。如果舌系带先天性过短，舌的前伸运动受限，舌不能伸至下唇外侧，舌尖部呈“V”型或“W”型，常造成吸吮、咀嚼和语言障碍。婴儿会影响哺乳吸吮。孩子长大后会影响发音，不能准确发出舌腭音及卷舌音，使人感到有“大舌头”的感觉。如何诊断舌系带是否过短？冯嘉健医师介绍说，家长可在100test出生42天后的常规检查中，让医生进行此项检查。如果未做此检查的，家长就需要细心观察，看100test的舌尖能否自然伸出口外，舌头是不是尖的，舌尖部是否呈“v”型或“w”型。如果家长没有留意，那就要等到100test会说话时，才能发现。半岁左右宜做舌系带矫正术 一旦确定100test舌系带过短，应及时带100test到医院口腔科就诊，确诊后用手术方法可以矫正，将舌系带剪一刀，便能取得良好的效果。手术最好在100test6个月~1周岁进行。这样伤口小，痊愈快，也不影响孩子学习语言。据介绍，如果100test太小，则不易缝针，同时局部麻药对孩子也有副作用。若100test超过一

岁，则因为有牙齿而难剪舌系带，同时也要全身麻醉。而100test半岁左右时，舌系带还较薄，手术之后伤口出血会少一些，伤口愈合得也会快一些。因此，进行舌系带矫正手术以半岁左右为宜。舌系带矫正手术称为“舌系带延长术”，手术简便，大约20分钟就能完成。手术后，100test2小时内不能吃东西。在手术后的两个星期内，家长要带100test到医院进行检查，看伤口愈合情况。对于2岁以上的孩子，在复查时，还要看看孩子说话口齿是否清楚，能不能说卷舌音等。冯医生表示，舌系带过短的孩子，在进行“舌系带延长术”后，症状会有明显的改善，说话口齿会清楚很多。对于一些年龄较大再进行手术的孩子，如果发音已经影响，那么术后还需要进行语音训练进行纠正。 小编推荐：[#0000ff>口腔执业医师考试综合模拟题一汇总](#) [#0000ff>2011年口腔执业医师颌面部损伤模拟题](#) [#0000ff>2011年口腔执业医师颌面部感染模拟题](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com