

中药词典：台湾肺形草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_655967.htm

台湾肺形草为龙胆科植物台湾肺形草及日本双蝴蝶的全草，主治黄疸；风热咳嗽。

台湾肺形草【拼音名】TáiW nFèiXínC o【来源】药材基源：为龙胆科植物台湾肺形草及日本双蝴蝶的全草。

拉丁植物动物矿物名：1. *Tripterospermum taiwanense* (Masam.) satake [Crawfurdia japonica Sieb. Et

Zucc. var. *tai-wanensis* Masam.] 2. *Tripterospermum japonicum*

(Sieb. et Zucc.) Maxim. [T. *taiwanense* (Masam.) satake

var. *alpinum* Satake] 采收和储藏：夏、秋季采收，洗净，晒干。

【原形态】1. 多年生缠绕草本。茎无毛，节间长7-15cm。叶对生；叶柄长1-3cm；叶片卵形、宽卵形、卵状披针形或披针形，长4-7(-11)cm，宽2-3.5cm，先端尾状渐尖，基部心形，稀近圆形，边缘细波状，上面绿色，下面淡绿色；叶脉3条。

花单生或成聚伞花序；花梗短，小苞片卵形或三角形；花萼钟形，萼筒长7-9mm，具翅，5裂，裂片线状披针形，不等大；花冠淡绿色、淡黄色或白色，狭钟形，长3.5-4cm，先端5裂，裂片三角形，褶三角形，偏斜，先端呈不规则的波状；

雄蕊5，着生于花冠筒下部，不整齐；子房披针形，具短柄，两端渐狭，长约3mm，基部具5裂的花盘，花柱线形，柱头2裂。浆果内藏，长圆形，有短柄。

2. 本种与台湾肺形草的区别在于：花萼筒通常具明显的翅；花冠淡紫色。浆果小，圆球形，长1-1.5cm，宽1-1.2cm，通常伸出花冠，具1.5-2.5cm

长的柄。花、果期8-12月。【生境分布】生态环境：1. 生于

海拔300-2300m的山坡阔叶林下。 2.生于海拔1300m-2400m的山坡林下。 资源分布：1.产我国台湾等地。 2.产我国台湾。

【化学成份】台湾肺形草全草含1,3,6,7四羟基吨酮 (norathyriol) , 1,3,6,7四羟基吨酮-6-O-β-D-葡萄糖甙 (tripteroside) , 熊果酸 (ursolic acid) 及齐墩果酸甲酯 (methyloleanate) 。日本双蝴蝶全草含齐墩果酸 (oleanolic acid) 、果甙 (mangiferin) , 1,8-二羟基-3,7-二甲氧基吨酮4-O-β-D-葡萄糖甙 (lancaside) 及C-4-β-D-葡萄糖基-1,3,7-三羟基吨酮 (lancerin) 。 【性味】苦；性凉 【功能主治】清热解毒；止咳。主治黄疸；风热咳嗽。 【用法用量】内服：煎汤，10-15g. 【摘录】《中华本草》相关推荐：
#0000ff>中药词典：铁鞭草 #0000ff>中药词典：木根 #0000ff>中药词典：藤本夜关门 特别推荐：#0000ff>2011年执业医师考试真题及答案（网友版）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com