

中药词典：台湾泡桐 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_656006.htm 台湾泡桐为玄参科植物台湾桐的树皮，主治风湿痹痛；疮痍肿毒；跌打骨折。

台湾泡桐【出处】始载于《中国植物志》。【拼音名】Tá i W ǎ n P à o T ó n【英文名】Bark or root of Kawakami Paulownia

【来源】药材基源：为玄参科植物台湾桐的树皮。拉丁植物动物矿物名：Paulownia kawakamii Ito采收和储藏：全年均可采，剥取树皮，或结合修剪取皮，鲜用或晒干。【原形态】

台湾泡桐 小乔木，高6-12m.树冠伞形，主干矮；小枝褐灰色，有明显皮孔。叶柄较长，幼时具长腺毛；叶片心脏形，大者长达48cm，先端具锐尖头，全缘或3-5浅裂或有角，两面均有粘毛，老时变为单条粗毛。花序枝的侧枝发达，几乎与中央主枝等势或稍短，故花序为宽大圆锥形，长可达1m；小聚伞花序无总花梗，有黄褐色绒毛，常有花3朵；花梗长12mm；花萼具明显的凸脊，有绒毛，萼齿深裂至一半以上，呈狭卵圆形，锐头，边缘有明显的绿色之沿；花冠近钟形，浅上比色至蓝紫色，长3-5cm，外有腺毛，花冠管的基部细缩，向上扩大，檐部2唇形，直径3-4cm；雄蕊长1-1.5cm，子房有腺毛，花柱长1.4cm.蒴果卵圆形，长2.5-4cm，先端有短喙，果皮薄，突萼辐射状，强裂反卷。种子长圆形，具翅，长3-4cm.花期4-5月，果期8-9月。【生境分布】生态环境：生于海拔200-1500m的山坡灌丛、疏林及荒地。资源分布：分布于浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、贵州。【性味】味苦；涩；性寒【功能主治】祛风解毒；接骨

消肿。主治风湿痹痛；疮痈肿毒；跌打骨折。【用法用量】
内服：煎汤，15-30g.外用：鲜品适量，捣烂敷。【各家论述】
《新华本草纲要》：叶：外用治跌打损伤。【摘录】《中华本草》
小编推荐：#0000ff>中药词典：沙旋复花 #0000ff>中药词典：蜀葵花 #0000ff>中药词典：石龙芮子 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com