

中药词典：伤寒草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/656/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E8\\_AF\\_8D\\_E5\\_c22\\_656286.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_656286.htm) 伤寒草为菊科植物夜香牛的全草或根，能疏风清热；除湿；解毒。伤寒草【出处】出自《岭南采药录》【拼音名】Shǎn Hán Cǎo【英文名】Herb of Ashycoloured Ironweed【别名】夜牵牛、星拭草、寄色草、返魂香、消山虎、假咸虾、枝香草、红花一枝香、四眼草、天红草、拐棍参【来源】药材基源：为菊科植物夜香牛的全草或根。拉丁植物动物矿物名：Vernonia cinerea (L.) Less.[V. ab-breuiana (Wall.) DC.]采收和储藏：夏、秋季采收全草，洗净，晒干切或鲜用；秋冬挖根，洗净，切片，晒干。【原形态】夜香牛一年生草本，高20-80cm。茎直立，柔弱，少分枝，有纵条纹，被贴伏短微毛。叶互生；具短柄；叶片条形、披针形或鞭形，长2-7cm，宽0.5-2.5cm，先端钝或短渐尖，基部渐狭成楔形，边缘有浅齿，少有近全缘，两面贴伏短毛，侧脉3-4对，背脉明显；近枝端的叶较狭而小。头状花序15-20（或更多）个，在枝端排列成伞房状圆锥花序；总苞钟状，直径5-6mm，总苞片4层，条状披针形，锐尖，常紫色，外面有贴伏短微毛；花托平，有边缘具细齿的窝孔；药冠管状；淡红紫色，长5-6mm，被疏短微毛，具腺，先端5裂，裂片线状披针形，小花约20朵，两性；瘦果，圆柱形，长约2mm，有线条，被微毛和腺点；冠毛白色，2层，外层极短。花期全年。【生境分布】生态环境：生于山坡、旷野、田边、路旁或密林、灌丛中。资源分布：分布于分浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广

东、海南、广西、四川、贵州、云南、西藏等地。【化学成份】 1.全草中分得香叶木素 (diosmetin)。木犀草素-7-O-葡萄糖醛酸甙 (luteolin-7-O-glucuronide)，木犀草素 (luteolin)，木犀草素-7-O-葡萄糖甙 (luteolin-7-O-glucoside)。 2.从新鲜花中分得木犀草素，木犀草素-7-O-葡萄糖甙，异荭草素 (isoorientin)，金对草素 (chrysoeriol)。 3.从根中分得5, 17 (20) 豆甾二烯 [stigmast-5, 17 (20) -dien-3 -ol]，36-甲基二十七碳酸 (36-methylheptacosanoic acid)，豆甾醇 (stigmasterol)，谷甾醇 (sitosterol)， $\beta$ -香树脂醇 ( $\beta$ -amyrin)， $\beta$ -香树脂乙酸酯 ( $\beta$ -amyrin acetate)， $\beta$ -香树脂醇乙酸酯 ( $\beta$ -amyrin acetate)。 3-乙酰氧基-13 (18)-乌苏烯 [3-ace-toxyrus-13 (18) -ene]，24-羟基-14-蒲公英赛烯 (24-hydroxy-taraxer-14-ene)。 4.地上部分含8-巴豆酰氧基-硬毛钩藤内酯-13-O-乙酸酯 (8-tigloyloxyhirsutinolide-13-O-acetate)，8- (4-羟基巴豆酰氧基)-硬毛钩藤内酯-13-乙酸酯 [8-(4-hydroxymethacryloyloxy)-hirsutinolide-13-O-acetate]，斯梯诺妥曼内酯-8-O-巴豆酸酯 (stilpnotomentolide-8-O-tiglate)，8- (4-羟基巴豆酰氧基)-10-羟基硬毛钩藤内酯-13-乙酸酯 [8-(4-hydroxymethacryloyloxy)-10-hydroxyhirsutinolide-13-O-acetate]，8- (4-羟基巴豆酰氧基)-10-羟基硬毛钩藤内酯-13-O-乙酸酯 [8-(4-hydroxytigloyloxy)-10-hydroxyhirsutinolide-13-O-acetate]，8- (4-羟基巴豆酰氧基)硬毛钩藤内酯-13-O-乙酸酯 [8-(4-hydroxytigloyloxy

) -hirsutinolide-13-O-aceta-te] , 白前内酯 ( glaucolide ) E , 19-羟基白前内酯E ( 19-hydroxyglau-colide ) E , 夜香牛内酯-8-O-( 4-羟异丁烯酸酯 ) [vernocinerolide-8-O-( 4-hydroxymethacrylate ) ]. 【药理作用】种子可作驱虫剂 ; 叶有弱的抗菌作用 , 但对疟原虫无效。 【性味】味苦 ; 辛 ; 性凉 【功能主治】疏风清热 ; 除湿 ; 解毒。主治感发热 ; 咳嗽 ; 急性黄疸型肝炎 ; 湿热腹泻 ; 白滞 ; 亲疮肿毒 ; 乳腺炎 ; 鼻炎 ; 毒蛇咬伤。 小编推荐 : #0000ff>中医执业医师中药学汇总 特别推荐 : #0000ff>2012年医师资格考试报考完全指南 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)