

中药词典：野芫荽 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_656378.htm 野芫荽为伞形科植物刺芹的带根全草，发表止咳；透疹解毒；理气止痛；利尿消肿。野芫荽【拼音名】Y Yuán Su 【别名】假芫荽、香信、番香茜、山芫荽、番鬼芫荽、大芫荽、德马炸锁、阿瓦芫荽、日本芫荽、洋芫荽、刺芫荽、假芫荽、节节花、野香草、侧香荽、芫荽【来源】药材基源：为伞形科植物刺芹的带根全草。拉丁植物动物矿物名：Eryngium foetidum L.采收和储藏：全年均可采，晒干。【原形态】二年生或多年生草本，高10-60cm.全株有特殊香气。根纺锤形。茎无毛，上部有三至五歧聚伞式分枝。基生叶革质，披针形或倒披针形，长5-25cm，宽1.2-4cm，先端钝，基部渐狭，有膜质叶鞘，边缘有骨质尖锐锯齿，两面无毛，羽状网脉达锯齿尖端成硬刺，无叶柄。花葶直立，粗壮，二歧分枝，具有疏生尖齿的茎生叶；由多数头状花序组成的聚伞花序具三至五回二歧分枝；总苞片5-6，叶状，开展且反折，边缘有1-3刺状锯齿；小总苞片披针形，边缘膜质透明；萼齿卵状披针形，先端尖锐；花瓣倒披针形至倒卵形，顶端内折，白色、淡黄色或草绿色；花柱直立或向外倾斜。双悬果球形或卵圆形，长1.1-1.3mm，宽2-1.3mm，表面有瘤状凸起，果棱不明显。花果期4-12月。【生境分布】生态环境：生于海拔100-1450m的丘陵、山地林下、林边、路旁、沟边等阴湿处、资源分布：分布于台湾、广东、海南、广西、云南、贵州等地。【化学成份】根含皂甙，根油中含2，3，6-三甲基苯甲醛（2，3

, 6-trimethylbenzaldehyde) , 2-甲酰-1, 1, 5-三甲基-2, 4-环己烯-6-醇 (2-formyl-1, 1, 5-trimethylcyclohexa-2, 4-dien-6-ol) 。全草含挥发油 , 内含2-十二碳烯醛 (dodec-2-en-1-al) , -蒎烯 (-pinene) , 小茴香醇 (fenchylalcohol) 及呋喃醇。另还含有水分、碳水化合物、粗蛋白、粗纤维和钙、磷、铁等无机元素。【性味】味辛 ; 苦 ; 性平【功能主治】发表止咳 ; 透疹解毒 ; 理气止痛 ; 利尿消肿。主治感冒 ; 咳喘 ; 麻疹不透 ; 咽痛 ; 胞痛 ; 食积 ; 呕逆 ; 腕腹胀痛 ; 泻痢 ; 肠痛 ; 肝炎 ; 淋痛 ; 水肿 ; 疮疖 ; 烫伤 ; 跌伤 ; 跌打伤肿 ; 蛇咬伤。【用法用量】内服 : 煎汤 , 6-15g.外用 : 适量 , 煎汤洗 ; 或捣敷。【摘录】《中华本草》相关推荐 : #0000ff>中医助理医师中药学汇总 特别推荐 : #0000ff>2012年医师资格考试报考完全指南 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com