

2012年口腔执业医师内科辅导：单纯疱疹的鉴别诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_656631.htm

本文介绍了口炎型口疮、三叉神经带状疱疹、手足口病、疱疹性咽峡炎、多形性红斑的鉴别诊断要点，供大家备考使用！

- 1.口炎型口疮 损害为散在分布的单个小溃疡，病程反复，不经过发疱期，溃疡数量较多，主要分布于口腔内角化程度较差的黏膜处，不造成龋炎，儿童少见，无皮肤损害。
- 2.三叉神经带状疱疹 是由水痘一带状疱疹病毒引起的颜面皮肤和口腔黏膜的病损。水疱较大，疱疹聚集成簇，沿三叉神经的分支排列成带状，但不超过中线。疼痛剧烈，甚至损害愈合后在一段时期内仍有疼痛。本病任何年龄都可发生，愈合后多不再复发。
- 3.手足口病 是因感染柯萨奇病毒A16、A5、A10和肠道病毒EV71型所引起的皮肤黏膜病。前驱症状有发热、困倦与局部淋巴结肿大，然后在口腔黏膜、手掌、足底出现散在水疱、丘疹与斑疹，数量不等。斑疹周围有红晕，无明显压痛，其中央为小水疱，皮肤的水疱数日后干燥结痂。口腔损害广泛分布于唇、颊、舌、腭等处，初起时多小水疱，迅速成为溃疡，经5~10日后愈合。但根据国内外资料，与其他肠道病毒引起的手足口病相比，由EV71型感染引起的疾病发生重症感染的比例较大，病死率也较高，重症病例病死率可达10%~25%，应该引起重视。
- 4.疱疹性咽峡炎 由柯萨奇病毒A4所引起的口腔疱疹损害，临床表现较似急性痘疹性龈口炎，但前驱期症状和全身反应都较轻，病损的分布只限于口腔后部，如软腭、悬雍垂、扁桃体处，为丛集成簇的小水疱，不久溃破成溃疡，损害很少

发于口腔前部，牙龈不受损害，病程大约7天。5.多形性红斑
多形渗出性红斑是一组累及皮肤和黏膜，以靶形或虹膜状红斑为典型皮损的急性炎症性皮肤黏膜病。诱发因素包括感染、药物，但也有些找不到明显诱因。黏膜充血水肿，有时可见红斑及水疱，但疱很快破溃，故最常见的病变为大面积糜烂，糜烂表面有大量渗出物形成厚的假膜，病损易出血，在唇部常形成较厚的黑紫色血痂，皮损为常对称分布于手背、足背、前臂，损害为红斑、丘疹、水疱、大疱或血疱等。斑疹为水肿性红斑，呈圆形或卵圆形，可向周围扩展，中央变为暗紫红色，衬以鲜红色边缘，若中央水肿吸收凹陷成为盘状者，称为靶形红斑。 小编推荐：[#0000ff>2012年口腔执业医师内科学汇总](#) [#0000ff>2012年口腔执业医师内科辅导：牙髓病的原因](#) [#0000ff>2012年口腔执业医师内科辅导：牙髓病的分类](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com