

注册会计师考试《审计》第九章练习(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/73/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E4\\_BC\\_9A\\_E8\\_c45\\_73320.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/73/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E4_BC_9A_E8_c45_73320.htm) 一、单项选择题 1、用来估计总体中的错误金额的抽样称为( )。 A、属性抽样 B、变量抽样 C、统计抽样 D、非统计抽样 2、审计抽样对控制测试和实质性测试都适用，但它并不适用于这些测试中的( )程序。 A、函证 B、顺查 C、逆查 D、分析性复核 3、在实质性测试中通常采用的审计抽样方法是( )。 A、属性抽样 B、变量抽样 C、固定样本量抽样 D、发现抽样 4、在控制测试中通常采用的审计抽样方法是( )。 A、属性抽样 B、变量抽样 C、差额估计抽样 D、比率估计抽样 5、在实质性测试中运用审计抽样，可以帮助注册会计师量化( )。 A、审计风险 B、固有风险 C、检查风险 D、控制风险 6、有关抽样风险与非抽样风险的下列表述中，注册会计师不能认同的是( )。 A、信赖不足风险与误拒风险会降低审计效率 B、信赖过度风险与误受风险会影响审计效果 C、非抽样风险对审计工作的效率和效果都有影响 D、审计抽样只与审计风险中的检查风险相关 7、注册会计师采用系统选择法从8000张凭证中选取200张作为样本，确定随机起点为凭证编号的第35号，则抽取的第5张凭证的编号应为( )号。 A、155 B、195 C、200 D、235 8注册会计师应当特别关注的，可能导致不正确审计结论的两种风险是( )。 A、信赖不足风险与误拒风险 B、信赖不足风险与误受风险 C、信赖过度风险与误拒风险 D、信赖过度风险与误受风险 9、下面哪个因素与选择的样本量成反向关系( )。 A、可信赖程度 B、预期总体误差 B、总体

容量 D、可容忍误差 10、 审计抽样通常不适用于 ( ) 审计程序。 A、 观察、 函证和计算 B、 检查、 观察和询问 C、 观察、 询问和分析性复核 D、 盘点、 计算和询问

二、 多项选择题

1、 审计抽样通常不应用于 ( )。 A、 顺查 B、 观察 C、 函证 D、 询问

2、 注册会计师在设计样本时， 应当考虑的因素有 ( )。 A、 审计目的和分层 B、 审计对象总体与抽样单位 C、 抽样风险和非抽样风险 D、 可信赖程度和可容忍误差

3、 影响审计效果的抽样风险类型有 ( )。 A、 信赖不足风险 B、 信赖过度风险 C、 误拒风险 D、 误受风险

4、 在控制测试中所发生的抽样风险的类型有 ( )。 A、 信赖不足风险 B、 信赖过度风险 C、 误拒风险 D、 误受风险

5、 常用的样本选取方法有 ( )。 A、 随机选样 B、 系统选样 C、 随意选样 D、 分层选样

6、 按审计抽样所了解的总体特征不同， 可以将审计抽样划分为 ( )。 A、 统计抽样 B、 非统计抽样 C、 属性抽样 D、 变量抽样

7、 在抽样风险中， 导致注册会计师执行额外的审计程序， 降低审计效率的风险有 ( )。 A、 信赖不足风险 B、 信赖过度风险 C、 误拒风险 D、 误受风险

8、 有关审计抽样的下列表述中， 注册会计师不能认同的有 ( )。 A、 审计抽样适用于会计报表审计的所有审计程序 B、 统计抽样的产生并不意味着非统计抽样的消亡 C、 统计抽样可以减少审计过程中的专业判断 D、 对可信赖程度要求越高， 需要选取的样本量就越大

9、 审计人员执行实质性测试时， 一般可采用 ( ) 等变量抽样方法。 A、 单位平均估计抽样 B、 发现抽样 C、 比率估计抽样 D、 差额估计抽样

10、 审计抽样只与审计风险要素中的 ( ) 相关。 A、 程序风险 B、 固有风险 C、 控制风险 D、 检查风险

100Test 下载频道开通， 各类考试题目直接下载。 详细请访问

