

CIA《实施内部审计业务》练习题79 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/86/2021_2022_CIA_E3_80_8

[A_E5_AE_9E_E6_c53_86676.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/86/2021_2022_CIA_E3_80_8) 1.从同一总体中以相同方式随意抽取的两个样本，一个样本规模是30，另一个样本规模是300。则下列陈述正确的是：A:两个样本具有相同期望值；B:较大的样本将产生更大的样本平均值；C:较小的样本对于平均值间有一个较小的95%的置信区间；D:一般而言，较小的样本有着较低的总体偏差估计值。 2.根据样本推断出总体平均值具有90%置信区间，意味着90%的可能是：A:估计值等于其实总体平均值；B:真实总体平均值不大于区间下限；C:标准差不大于总体平均值的10%；D:真实总体平均值存在于特定的置信区间内。 3.用非参量统计方法而不采用更传统的统计方法的正确理论是：A:尚不知道如何分配受测试的变量；B:受测试的差异或事项相当小，所以需要做敏感度更高的测试；C:样本不是随意抽取；D:受测试的变量是一个连续的变量。 4.某审计师正在考虑抽取50各样本以估计每张发票平均金额大小。如果样本规模增加到200，抽样结果的准确性将受怎样影响？A:精确度将是原来的两倍；B:精确度将是原来的四倍；C:虽然精确度不会增加那么多，但每张发票平均估计中可能偏低的倾向会得到更证；D:既然两个样本规模均大于30，因此样本量的增加对精确度不会有很大的影响。 5.在决定样本规模方面，以下哪项不是重要的考虑因素？A:是否样本被设计用来估计一个平均数或一个比例；B:总体中变量的多少尚待研究；C:用样本决策对估计错误的敏感性；D:每个样本观察的成本。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com